

Осуществление Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Европейском регионе ВОЗ на основе комплекса стратегий MPOWER, 2019 г.



Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) и руководящие принципы ее осуществления обеспечивают странам прочную правовую основу для выполнения положений Конвенции и управления мерами борьбы против табака. В целях содействия решению этой задачи в 2008 году был разработан комплекс мер MPOWER, направленных на расширение усилий по выполнению конкретных положений РКБТ ВОЗ на страновом уровне (рис. 1).

Рис. 1. MPOWER

<h2>Monitor</h2> <p>Мониторинг употребления табака и стратегий профилактики</p>	<h2>Protect</h2> <p>Защита людей от табачного дыма</p>	<h2>Offer</h2> <p>Предложение помощи в целях прекращения употребления табака</p>	<h2>Warn</h2> <p>Предупреждение об опасностях, связанных с табаком</p>	<h2>Enforce</h2> <p>Обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий</p>	<h2>Raise</h2> <p>Повышение налогов на табачные изделия</p>
---	--	--	--	--	---

В июле 2019 г. был опубликован седьмой Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии (1). В докладе приводятся сопоставимые данные, позволяющие провести анализ прогресса, достигнутого странами в деле защиты населения от разрушительных последствий употребления табака на глобальном, региональном и страновом уровнях.


Для анализа общего хода осуществления комплекса мер MPOWER в Регионе по сравнению с глобальной ситуацией, а также каждой меры в отдельности, в настоящей подборке информационных бюллетеней используются данные последнего Доклада ВОЗ о глобальной табачной эпидемии.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОЗ С ГЛОБАЛЬНЫМИ

На рисунке 2 представлена доля стран, которые достигли наивысшего уровня выполнения конкретных мер - то есть рекомендуемого уровня борьбы против табака в рамках этой меры.

Рис. 2. Страны, осуществляющие меры MPOWER на рекомендуемом уровне: Европейский регион по сравнению с глобальным уровнем, по состоянию на 2018 г.

● Глобальный уровень ● Европейский регион ВОЗ



➤ ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Некоторые страны Региона считаются глобальными лидерами в борьбе против табака, и полное осуществление различных статей РКБТ ВОЗ этими странами может быть использовано в качестве примеров передовой практики.
- Большинство стран Европейского региона демонстрируют эффективные результаты в отношении мер, направленных на **мониторинг употребления табака и стратегии профилактики** (74%) и **предупреждение об опасностях, связанных с табаком** (72%).
- Регион также демонстрирует лучшие результаты, чем на глобальном уровне, в отношении **повышения налогов на табачные изделия** (47% по сравнению с 20%). Однако тот факт, что более чем в половине стран Европейского региона ставки налогов установлены на уровнях ниже уровня передовой практики, представляет собой упущенную возможность мобилизации средств для осуществления мер борьбы против табака и для работы сектора здравоохранения в целом.
- **Предложение помощи в целях прекращения употребления табака** осуществляется на уровне передовой практики только в восьми странах. В 42 странах предлагается некоторый уровень поддержки.
- Процент стран с **всеобъемлющими законами о запрете курения** в Европейском регионе ниже, чем на глобальном уровне (26% и 32% соответственно). Поскольку в 21 стране действуют частичные законы, необходимо обеспечить дополнительные усилия для принятия всеобъемлющих законов о запрете курения с целью охраны здоровья населения от вредного воздействия вторичного табачного дыма.
- Почти в два раза больше стран на глобальном уровне ввели **запрет на все формы рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий**, чем в Европейском регионе ВОЗ (25% против 13%).
- Осуществление всех мер комплекса MPOWER должно быть активизировано как в Регионе, так и на глобальном уровне.

➤ В Глобальном плане действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. (2) содержится **цель сокращения глобального показателя распространенности употребления табака (курительного и бездымного табака) на 30% к 2025 г. по сравнению с показателем 2010 г.** В Европейском регионе был проведен анализ тенденций, охватывающих 98% населения Региона, который показал, что:



1. **шесть стран**,¹ вероятно, достигнут к 2025 году **относительного сокращения показателя распространенности употребления табака по крайней мере на 30%** при условии продолжения осуществления мер борьбы против табака нынешними темпами;
2. **35 стран** смогут достичь **снижения распространенности употребления табака, но менее чем на 30%**;
3. в **шести странах**² значительные **изменения в распространенности употребления табака маловероятны**;
4. еще **шесть стран не располагают достаточными данными для анализа тенденций**;
5. в **Европейском регионе** в целом наблюдается медленное снижение распространенности употребления табака, которое при настоящих темпах приведет к **относительному сокращению в период между 2010 и 2025 гг. на 18%** (3).

Борьба против табака также является неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития. Задача, поставленная в Цели в области здравоохранения Целей устойчивого развития (ЦУР), прямо призывает к активизации осуществления РКБТ ВОЗ (ЦУР 3.a) в знак признания последствий для развития стран бремена болезней, обусловленных употреблением табака, и более 8 миллионов жизней, уносимых ежегодно из-за воздействия табака.

Как показывает подборка информационных бюллетеней, несмотря на многие достижения, прогресс в принятии и соблюдении стратегий и мер в области борьбы против табака остается неравномерным. Их осуществление необходимо активизировать, чтобы гарантировать, что ни одно государство-член не останется позади, и что страны смогут выполнить установленные в РКБТ ВОЗ и ЦУР ограниченные временными рамками обязательства, относящиеся к борьбе против табака, к 2030 году.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ³

1. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2019 г. (https://www.who.int/tobacco/global_report/en/).
2. Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2013 г. (https://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/).
3. Доклад ВОЗ о мировых тенденциях распространенности употребления табака за 2000–2025 гг., третье издание. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2019 г. (<https://www.who.int/publications-detail/who-global-report-on-trends-in-prevalence-of-tobacco-use-2000-2025-third-edition>).

¹ Эти страны: Австрия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Соединенное Королевство.

² Эти страны: Хорватия, Франция, Кыргызстан, Португалия, Республика Молдова и Словакия.

³ Веб-ссылки по состоянию на 10 марта 2020 года.