

Мониторинг употребления табака и стратегий профилактики

> ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Рис. 1. Мониторинг распространенности употребления табака в странах Европейского региона ВОЗ, 2018 г. (%)



По состоянию на 2018 г. почти во всех странах Европейского региона ВОЗ имелись как минимум актуальные и репрезентативные данные либо по взрослым, либо по молодежи.

Тридцать девять стран (74%) достигли рекомендованного уровня мониторинга для обеих групп, что означает, что в этих странах имелись актуальные, репрезентативные и периодические данные как по взрослым, так и по молодежи (рис. 1).



ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?

- Странам следует установить приоритеты и мобилизовать адекватное финансирование мониторинга осуществления мер профилактики и борьбы с употреблением табака. Мониторинг является важным компонентом Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и обеспечивает основу для эффективной разработки и осуществления стратегий борьбы против табака.
- Мониторинг осуществления мер борьбы против табака должен включать: мониторинг показателей распространенности употребления табака (часто понимаемых как эпиднадзор за моделями и тенденциями употребления табака); мониторинг подверженности воздействию табачного дыма; мониторинг политики, направленной на снижение уровней потребления табака или воздействия табачного дыма.
- Для обеспечения сопоставимости данных следует использовать стандартизированные инструменты мониторинга и эпиднадзора.
- Обследования должны проводиться через регулярные интервалы, чтобы обеспечить количественную оценку изменений в ходе эпидемии.
- Стандартизированные вопросы о распространенности употребления табака и осуществлении мер MPOWER в целях сокращения потребления табака могут включаться в существующие национальные формуляры по обследованию населения или формуляры переписи населения.
- Результаты обследования следует распространять через документы правительственной политики, академические публикации и средства массовой информации (репортажи, а также платные средства СМИ) (2, 3).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ¹

- Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2019 г. (https://www.who.int/tobacco/global_report/en/).
- Мониторинг является одной из важнейших мер борьбы против табака. На сайте: Брошюры и другие материалы MPOWER [веб-сайт]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г. (https://www.who.int/tobacco/mpower/publications/ru_tfi_mpower_m.pdf).
- Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака [веб-сайт]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г. (<https://www.who.int/fctc/ru/>).

¹ Веб-ссылки по состоянию на 10 марта 2020 года.