



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА

Азербайджан

Антитабачные меры, соответствующие принципам Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), и их воздействие на здоровье населения



Согласно прогнозам, основанным на нынешних показателях распространенности курения среди взрослых в Азербайджане (1), до 653 000 из 1,3 млн живущих сегодня курильщиков подвергаются риску преждевременной смерти в связи с курением (Таблица 1), а в отсутствие более активных антитабачных мер эта цифра может увеличиться.

ТАБЛИЦА 1.

Исходные показатели распространенности курения и прогнозируемое изменение числа преждевременных смертей

Распространенность курения (%)		Курильщики (n)		Прогнозируемое количество преждевременных смертей среди нынешних курильщиков (n)			
Мужчины	Женщины	Всего		Мужчины ^a	Женщины ^a	Всего ^a	Всего ^b
35,3	0,0	1 306 100		653 050	—	653 050	424 483

^a Расчет прогнозируемого числа преждевременных смертей основан на уровнях относительного риска, выявленных в ходе широкомасштабных исследований в странах с высоким уровнем дохода.

^b Расчет прогнозируемого числа преждевременных смертей основан на уровнях относительного риска, выявленных в ходе широкомасштабных исследований в странах с низким и средним уровнем дохода.

Источник: ВОЗ (1).

Основные факты

По прогнозам, в течение 15 лет отдельные антитабачные меры – при условии их реализации в полном соответствии с принципами РКБТ ВОЗ (2) – позволят сократить распространенность курения на:

- 33% за счет повышения до 75% акциза на сигареты (от нынешнего уровня, равного 2,02%), что будет способствовать существенному сокращению числа новых потенциальных курильщиков среди молодежи;
- 9% за счет принятия более всеобъемлющих законов о запрете курения и более строгих мер по обеспечению их соблюдения;

- 5,5% путем принятия и реализации законов, запрещающих большинство видов прямой и косвенной рекламы табачных изделий, с целью внедрения запрета на все виды рекламы, стимулирования продажи и спонсорства, используемые табачными компаниями;
- 9% за счет введения требования о нанесении на упаковки табачных изделий сильнодействующих графических предупреждений о вреде табака для здоровья;
- 3,6% за счет перехода от минимальных программ оказания помощи в отказе от курения к широко разрекламированной и всеобъемлющей политике, направленной на содействие прекращению употребления табака; а также
- 7,5% за счет повышения интенсивности антитабачной социальной рекламы от низкого до высокого уровня.

При использовании этого более сильного комплекса антитабачных мер, основанных на принципах РКБТ ВОЗ (2), распространенность курения может быть уменьшена на 41% в течение пяти лет, на 53% в течение 15 лет и на 63% в течение 40 лет. Таким образом, благодаря вышеуказанным мерам в долгосрочной перспективе можно предотвратить 414 000 преждевременных смертей (Таблица 2). В модели борьбы против табака под названием SimSmoke (3) используется синергетический эффект, достигаемый в результате одновременного использования нескольких подходов (проведение интенсивных антитабачных кампаний в СМИ, внедрение законов о запрете курения, организация помощи в прекращении потребления табака и т.д.).

ТАБЛИЦА 2.

Влияние антитабачных мер (по отдельности и вместе) на показатели распространенности курения и смертности от курения

Антитабачные меры	Относительное изменение распространенности курения (%)			Прогнозируемое сокращение числа смертей, связанных с курением, в перспективе на 40 лет (n)			
	5 лет	15 лет	40 лет	Мужчины ^a	Женщины ^a	Всего ^a	Всего ^b
Защита общественного здоровья путем принятия и реализации законов о запрете курения	-7,8	-9,0	-9,8	63 882	—	63 882	41 524
Предложение помощи в прекращении потребления табака	-2,1	-3,6	-5,1	33 476	—	33 476	21 759
Антитабачные кампании в СМИ	-6,5	-7,5	-7,8	50 938	—	50 938	33 110
Предупреждения о вреде курения на пачках сигарет	-6,0	-9,0	-12,0	78 366	—	78 366	50 938
Обеспечение соблюдения ограничений на маркетинг табачных изделий	-4,6	-5,5	-6,0	39 052	—	39 052	25 384
Повышение налогов на сигареты	-22,0	-33,0	-44,0	287 082	—	287 082	186 603
Комплексное применение антитабачных мер	-40,9	-53,2	-63,4	414 095	—	414 095	269 162

^a Расчет прогнозируемого числа связанных с курением смертей основан на уровнях относительного риска, выявленных в ходе широкомасштабных исследований в странах с высоким уровнем дохода.

^b Расчет прогнозируемого числа связанных с курением смертей основан на уровнях относительного риска, выявленных в ходе широкомасштабных исследований в странах с низким и средним уровнем дохода.

→ Мониторинг потребления табака

В 2012 г. распространенность курения в Азербайджане среди взрослых (15 лет и старше) составляла 16,7% (мужчины: 35,3%; женщины: 0,0%) (1).

→ Защита людей от табачного дыма

В Азербайджане полностью запрещено курение в медицинских и образовательных учреждениях (включая университеты и другие вузы) (Таблица 3). Имеется специальная статья государственного бюджета выделенных средств для обеспечения исполнения этого запрета и создана система подачи и рассмотрения жалоб граждан. Однако в случае нарушения этого запрета штраф не налагается ни на учреждения, ни на курильщиков (4).

ТАБЛИЦА 3.

Закрытые общественные места, где курение полностью запрещено

Медицинские учреждения	Учебные заведения (кроме университетов и других вузов)	Университеты и другие вузы	Государственные учреждения	Офисы и другие рабочие помещения	Рестораны	Кафе, пабы и бары	Все виды общественного транспорта	Все другие закрытые общественные места
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Источник: ВОЗ (4).

✓ = полный запрет курения.

✗ = неполный запрет курения.

→ Предложение помощи в отказе от потребления табака

В Азербайджане не существует системы услуг по оказанию помощи в прекращении курения. Средства никотинзаместительной терапии можно приобрести в аптеке без рецепта, но расходы на них не возмещаются. В стране не имеется бесплатной консультативной телефонной линии по отказу от потребления табака (4).

→ Предупреждения о вреде табака

Согласно закону предупреждения о вреде курения для здоровья должны занимать не менее 30% лицевой и оборотной стороны упаковки табачных изделий. В законодательном порядке утвержден один вид таких предупреждений. Они размещаются на каждой пачке табачных изделий и любой внешней упаковке и маркировке, используемой в розничной продаже. Также в законодательном порядке определен размер/стиль и цвет предупреждений о вреде табака для здоровья, написанных на основном языке (языках) страны. Однако используемые предупреждения не сопровождаются фотографией или графическим изображением и не содержат описание вредных последствий потребления табака (4).

→ Обеспечение соблюдения запрета на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака

В соответствии с принятым в 1997 г. законом, в который затем было внесено несколько поправок (5), в Азербайджане введен запрет на все виды прямой и некоторые виды косвенной рекламы табачных изделий (Таблица 4). Однако в случае нарушения этих запретов наказание в виде штрафа законом не предусмотрено (4).

ТАБЛИЦА 4.

Запреты на прямую и косвенную рекламу табачных изделий

Прямая реклама	Косвенная реклама
Национальное телевидение и радио	✓ Распространение бесплатных табачных изделий по почте или с помощью других средств
Международное телевидение и радио	✓ Рекламные скидки
Местные журналы и газеты	✓ Отождествление нетабачных изделий с названиями табачных брендов
Международные журналы и газеты	✓ Демонстрация табачных брендов на ТВ и/или в фильмах (продакт-плейсмент)
Рекламные щиты и наружная реклама	✓ Демонстрация табачных изделий на ТВ и/или в фильмах
Реклама в точке продажи	✓ Мероприятия, спонсируемые табачными компаниями
Реклама по интернету	✓ Размещение табачных изделий в точке продажи

Источник: ВОЗ (4).

✓ = запрещено. — = не запрещено.

В Азербайджане не используются следующие виды антитабачных мер:

- законы, запрещающие табачным компаниям рекламировать свою деятельность и организуемые ими мероприятия;
- законы, запрещающие организациям или учреждениям, не являющимся табачными компаниями, рекламировать деятельность табачных компаний и организуемые ими мероприятия;
- законы, запрещающие табачным предприятиям финансировать или вносить вклады (включая вклады в натуральной форме) в кампании по профилактике курения, в том числе кампании, направленные на молодежь; а также
- требование показывать предписанную законом антитабачную рекламу до, во время или после трансляции или показа любого развлекательного мероприятия (4).

→ Повышение налогов на табачные изделия

Пачка сигарет в Азербайджане стоит 1,40 AZN¹ (1,79 долл. США), включая налог, составляющий 17,30% (15,25% – налог на добавленную стоимость, 2,02% – акциз и 0,03% – импортная пошлина) (4).

¹ Код валюты приведен в соответствии с названиями и кодами валют, утвержденными Международной организацией по стандартизации (Стандарт ISO 4217).

Сведения о модели SimSmoke

Сокращенная версия модели SimSmoke, которая была разработана David Levy из университета Georgetown, Соединенные Штаты Америки, позволяет прогнозировать сокращение распространенности курения и смертей, связанных с курением, при реализации антитабачных мер (по отдельности и вместе) (3). В частности, эта модель позволяет прогнозировать потенциальный эффект следующих мер:

- защита граждан от воздействия окружающего табачного дыма с помощью принятия и реализации более строгих законов о запрете курения
- организация и более активное предложение гражданам помощи в отказе от курения
- размещение предупреждений о вреде табака на упаковках табачных изделий и распространение таких предупреждений с помощью средств массовой информации и образовательных программ
- обеспечение соблюдения запрета на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака
- повышение цен на сигареты за счет повышения налогов (6).

Данные о распространенности курения среди взрослых для модели SimSmoke были взяты из самого последнего национального репрезентативного обследования, охватывающего широкий возрастной диапазон; данные о воздействии антитабачных мер были взяты из Доклада ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015 г. (4).

Финансирование

Публикация этого информационного бюллетеня стала возможной благодаря финансированию со стороны Правительства Российской Федерации.

Библиография

1. Prevalence – most recent adult survey data by country.
Источник: Global Health Observatory data repository (European Region) [online database]. Geneva: World Health Organization; 2016 (<http://apps.who.int/gho/data/node.main-euro.TOB1249?lang=en>, по состоянию на 27 декабря 2016 г.).
2. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака [веб-сайт]. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (<http://www.who.int/fctc/ru/>, по состоянию на 17 марта 2017 г.).
3. Levy DT, Fouad H, Levy J, Dragomir A, El Awa F. Application of the abridged SimSmoke model to four eastern Mediterranean countries. *Tob Control* 2016; 25(4):413–21. doi:10.1136/tobaccocontrol-2015-052334.
4. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015 г.: Повышение налогов на табачные изделия. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2015 г. (http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/summary/ru/, по состоянию на 17 марта 2017 г.).
5. Tobacco control database for the WHO European Region [онлайновая база данных]. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016 г. (<http://data.euro.who.int/tobacco/>, по состоянию на 27 декабря 2016 г.).
6. Комплекс мер MPOWER. Источник: Инициатива по освобождению от табачной зависимости (TFI) [веб-сайт]. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (<http://www.who.int/tobacco/mpower/ru/>, по состоянию на 27 марта 2017 г.).

Выражение благодарности

Анализ данных: David Levy и Jeffrey Levy, университет Georgetown, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки

Текст: Kristina Mauer-Stender, Natalia Toropova, Elizaveta Lebedeva, Европейское региональное бюро ВОЗ

Редакторы: Alex Mathieson, Эдинбург, Соединенное Королевство

Графический дизайн: Carli Hyland, Hill+Knowlton Strategies, Копенгаген, Дания